

# ЛЕВОЛЕТ

ЛЕВОФЛОКСАЦИН 500 мг №10

## ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР



65LEV-12/03/2015-Rx2

**Выдержка из инструкции к медицинскому применению препарата Леволет.**

**Состав:** действующее вещество: левофлоксацин. 1 таблетка, содержит левофлоксацина 500 мг в виде левофлоксацина гемигидрата;

**Фармакотерапевтическая группа.** Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны.  
Код АТХ J01M A12.

**Показания.**

- Хронический бактериальный простатит.
- Осложненные и неосложненные инфекции мочевыводящих путей (в том числе пиелонефрит)
- Пневмония
- Обострение хронического бронхита
- Острый синусит
- Инфекции кожи и мягких тканей

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим хинолонам или любому другому компоненту препарата; эпилепсия; пациенты с жалобами на побочные реакции со стороны сухожилий после предыдущего применения хинолонов.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Из-за отсутствия исследований и возможности повреждения хинолонами суставного хряща растущего организма, левофлоксацин нельзя назначать беременным и женщинам, которые кормят грудью. Если во время лечения левофлоксацином наступила беременность, об этом следует сообщить врачу.

**Дети.** Детям нельзя применять левофлоксацин из-за возможного повреждения суставного хряща.

**Побочные реакции.** Микозы (включая *Candida* и пролиферацию других резистентных микроорганизмов), зуд и покраснение кожи, общие реакции повышенной чувствительности (анафилактические и анафилактоидные) с такими признаками как крапивница, спазм бронхов и, возможно, тяжелая одышка, а также отек кожи и слизистых оболочек (например, кожи лица и слизистой оболочки глотки), внезапное снижение артериального давления и шок, удлинение QT-интервала, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, высыпания на коже и слизистых оболочках, гипергидроз, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксудативная мультиформная эритема, тошнота, диарея, вздутие живота, запоры, стоматит, отсутствие аппетита, рвота, боль в животе, расстройства пищеварения, панкреатит, диарея с примесью крови, которая иногда может быть признаком воспаления кишечника, в том числе псевдомембранозного колита и др

**Упаковка.** По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.

**Категория отпуска.** По рецепту.

Информация о лекарственном средстве предназначена для медицинских и фармацевтических работников.

Перед назначением ознакомьтесь с полным текстом инструкции к медицинскому применению.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: Представительство «Др. Редди'с Лабораториес Лимитед», Столичное шоссе, 103, оф. 11-Б, г. Киев, Украина, 03131, тел. +380442075197