

## РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КО-ИНФЕКЦИИ ТБ/ВИЧ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕВОГО БЕРЕГА ГОРОДА КИЕВА

**В. П. Мельник, Т. Г. Хурса, Я. А. Якимова**

*Резюме*

Обследовано 503 больных ко-инфекцией ТБ/ВИЧ. Отмечен рост показателя заболеваемости (в 1,6 раза) и распространенности (в 2 раза) ко-инфекции ТБ/ВИЧ в период 2012–2015 гг. вместе с прогрессирующим ростом заболеваемости ТБ (почти в 2 раза). Установлено постепенное уменьшение удельного веса инфильтративного туберкулеза (с 76,5 % до 54,5 %) и рост удельного веса диссеминированного туберкулеза (с 17,1 % до 40,9 %). Выявлена высокая летальность больных от ко-инфекции ТБ/ВИЧ, которая в 1,4 раза выше, чем при туберкулезе без ВИЧ-инфекции.

**Ключевые слова:** ко-инфекция ТБ/ВИЧ, заболеваемость, распространенность, смертность.

**Ukr. Pulmonol. J. 2017; 2: 11-14.**

*Vasyl P. Melnyk*

*Private higher educational establishment «Kyiv medical university»*

*Chief of infectious diseases, tuberculosis and pulmonology department*

*Kyiv city tuberculosis hospital # 1*

*123/3, Kharkivske shoes, Kyiv, Ukraine*

*Tel./fax: 38 (044) 562-87-14, 38 (044) 576-03-23*

---