СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР

це швидкодопоміжний протизапальний бронхолітик
ЗА ПОТРЕБОЮ + контролюючий препарат
ДЛЯ ПІДТРИМУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ* — ЛІКУЄ КОЛИ ПОТРІБНО![1]

Відтепер СИМБІКОРТ (будесонід/формотерол) — це ПЕРЕВАЖНИЙ ВИБІР[2] швидкодопоміжного протизапального бронхолітика ЗА ПОТРЕБОЮ для середнього ступеня важкості та тяжких пацієнтів з бронхіальною астмою, що природно шукають полегшення та зниження ризику загострень.

Література: 1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Симбікорт Турбухалер. Реєстраційні посвідчення № UA/5433/01/01, UA/5433/01/02 і UA/5433/01/03, затверджені Наказом МОЗ України №485 від 16.03.2021 з необмеженим терміном дії з 16.03.2021р., зі змінами Наказ МОЗ України №214 від 04.02.2023.
2. GINA, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2023. Available from: http:// www.ginasthma.org/.

* мається на увазі можливість використання Симбікорт Турбухалер як для підтримуючої терапії бронхіальної астми (БА) так і для полегшення симптомів в одному доставковому пристрої для пацієнтів на 3–5 кроках терапії GINA.

Особи, зображення яких міститься в матеріалі, є виключно моделями і не є пацієнтами, використовуються виключно в ілюстративних цілях. Інформаційний матеріал призначений виключно для фахівців у сфері охорони здоров'я.

Коротка інформація щодо медичного застосування лікарського засобу СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР (порошок для інгаляцій дозований). **Склад.**1 доза містить 80 або 160 мкг будесоніду мікронізованого та 4,5 мкг формотеролу фумарату дигідрату або 320 мкг будесоніду мікронізованого та 9 мкг формотеролу фумарату дигідрату; допоміжна речовина: лактоза, моногідрат. **Фармакологічні властивості.** До складу Симбікорту входять формотерол та будесонід, що мають різний механізм дії та проявляють адитивний ефект щодо зниження частоти загострень бронхіальної астми. Будесонід – глюкокортикостероїд з дозозалежною протизапальною дією. Формотерол – селективний агоніст β_2-адренергічних рецепторів швидкої і тривалої дії. **Показання до застосування.** ***Доза 320/9 мкг и доза 160/4,5 мкг:*** Для симптоматичного лікування пацієнтів віком від 18 років із ХОЗЛ з ОФВ1 < 70% прогнозованої норми (після застосування бронходилататора) та наявністю в анамнезі загострень, незважаючи на регулярну терапію бронходилататорами. Для регулярного лікування бронхіальної астми (дорослі і діти з 12 років) у випадку доцільного застосування комбінованої терапії (інгаляційного кортикостероїду та агоніста β_2-адренорецепторів тривалої дії): пацієнтам, стан яких недостатньо контролюється за допомогою інгаляційних кортикостероїдів та швидкодіючих агоністів β_2-адренорецепторів, що застосовуються у разі потреби, або пацієнтам, стан яких належно контролюється інгаляційними кортикостероїдами та агоністами β_2-адренорецепторів тривалої дії. ***Доза 80/4,5 мкг:*** Для регулярного лікування бронхіальної астми (дорослі і діти з 6 років) у випадку доцільного застосування комбінованої терапії (інгаляційного кортикостероїду та β_2-агоніста тривалої дії): пацієнтам, стан яких недостатньо контролюється за допомогою інгаляційних кортикостероїдів та швидкодіючих β_2-агоністів, що застосовуються у разі потреби або пацієнтам, стан яких належно контролюється інгаляційними кортикостероїдами та β_2-агоністами тривалої дії. Не підходить для лікування пацієнтів з тяжкою бронхіальною астмою. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу або лактози. **Побічні реакції.** Див. інструкцію для медичного застосування. Найбільш поширені побічні реакції: головний біль, тремор, кандидоз ротової порожнини та горла, незначне подразнення в горлі, кашель, захриплість, прискорене серцебиття, нудота, запаморочення, судоми м'язів, пневмонія у пацієнтів з ХОЗЛ. **Спосіб застосування та дози.** ***ХОЗЛ (дорослі):*** *Доза 320/9 мкг:* 1 інгаляція двічі на добу. *Доза 160/4,5мкг:* 2 інгаляції двічі на добу. ***Бронхіальна астма: Підтримуюча терапія та полегшення симптомів астми (тільки для дози 160/4,5 мкг та 80/4,5 мкг)***. *Дорослі і підлітки (від 12 років)*: підтримуюча доза становить 1 інгаляцію 2 рази на добу вранці та ввечері або 2 інгаляції вранці або ввечері. Деяким пацієнтам може бути рекомендована підтримуюча доза по 2 інгаляції 2 рази на добу. При виникненні симптомів слід застосовувати додаткову інгаляцію Симбікорту для їх усунення. Якщо симптоми не припиняються, слід використати ще одну інгаляцію. Не слід проводити більше 6 інгаляцій за один раз. Загальна добова доза не повинна перевищувати 8 інгаляцій, проте тимчасово може бути використано до 12 інгаляцій на добу. Пацієнтам, які застосовують більше 8 інгаляцій на добу, настійно рекомендується звернутися до лікаря. ***Підтримуюча терапія:*** *Дорослі:* 1-2 інгаляції двічі на добу. Деяким пацієнтам (від 18 років) може знадобитися до 2 інгаляцій два рази на добу. *Підлітки (12-17 років)*: 1 інгаляція двічі на добу. ***Доза 160/4,5мкг та 80/4,5 мкг:*** *Підлітки (12-17 років) та дорослі*: 1-2 інгаляції двічі на добу. Деяким пацієнтам (від 18 років) може знадобитися до 4 інгаляцій два рази на добу. ***Доза 80/4,5 мкг:*** Діти (з 6 років): 2 інгаляції два рази на добу. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Див. повну інструкцію для медичного застосування лікарського засобу. Плазмові рівні будесоніду можуть помітно зростати при супутньому застосуванні лікарського засобу з потужними інгібіторами CYP3A4, тому одночасного застосування цих препаратів слід уникати. Пацієнтам, які приймають потужні інгібітори CYP3A4, не рекомендується застосовувати Симбікорт одночасно для підтримуючої терапії та полегшення симптомів. При супутньому застосуванні хінідину, дизопіраміду, прокаїнаміду, фенотіазинів, антигістамінів, а також трициклічних антидепресантів може подовжуватися QTc-інтервал та зростати ризик шлуночкової аритмії. **Особливості застосування.** Див. повну інструкцію для медичного застосування лікарського засобу. При необхідності припинити лікування рекомендується поступово зменшувати дозу, а не різко скасовувати терапію. Терапію Симбікортом не слід розпочинати у період загострення бронхіальної астми, гострого прояву або значного погіршення її перебігу. Інфекції нижніх дихальних шляхів, в тому числі пневмонія, спостерігалися після інгаляційного застосування кортикостероїдів. Рекомендовано регулярно контролювати ріст дітей, які тривалий час застосовують інгаляційні кортикостероїди. **Умови відпуску.** За рецептом. **Умови зберігання.** Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 30°C. Зберігати упаковку щільно закритою для захисту від проникнення вологи.

Детальна інформація про призначення лікарського засобу викладена в Інструкції для медичного застосування.Перед призначенням лікарського засобу ознайомтеся з повною інструкцією для медичного застосування. Текст складений згідно з Інструкціями для медичного застосування лікарського засобу Симбікорт Турбухалер. Реєстраційні посвідчення № UA/5433/01/01, UA/5433/01/02 і UA/5433/01/03, затверджені Наказом МОЗ України №485 від 16.03.2021 з необмеженим терміном дії з 16.03.2021 р., зі змінами Наказ МОЗ України №214 від 04.02.2023. ***Якщо у Вас, у Вашого пацієнта, родича було відмічено виникнення побічної реакції чи випадок відсутності ефекту на будь-який з продуктів компанії АстраЗенека, будь ласка, повідомте про це в ТОВ «АстраЗенека Україна» одним із наведених нижче способів. Це можливо за телефоном: +38 044 39152 82 (запросити відповідального за фармаконагляд) або електронною поштою*** PatientSafety.Ukraine@astrazeneca.com/ ***Також, Ви можете повідомити нам дану інформацію за посиланням:*** https://contactazmedical.astrazeneca.com/content/astrazeneca-champion/ua/uk/amp-form.html (виберіть мову та опцію- «повідомити про побічну реакцію»). *Запити, що стосуються медичної інформації, направляйте, будь ласка, за адресою* https://contactazmedical.astrazeneca.com/content/astrazeneca-champion/ua/uk/amp-form.html (виберіть опцію «запит медичної інформації»). Також, запит можна відправити електронною поштою: Ukraine-Medinfo@astrazeneca.com/

Дана інформація призначена виключно для співробітників медичної та фармацевтичної галузі, для розміщення в спеціалізованих виданнях, а також для поширення на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Симбікорт Турбухалер – торгова марка, власність компанії АстраЗенека. ©AstraZeneca 2007-2023.

За повною інформацією звертайтеся до ТОВ «АстраЗенека Україна» 01033 м. Київ, вулиця Сім'ї Прахових, 54, Тел: +38 044 391 52 82. Факс: +38 044 391 52 82.

UA-4388. Approved June 2023

AstraZeneca